

¿Están listos sus hijos?

Qué requiere la ley de inmunización de Minnesota

Requisitos de vacunación

Use esta tabla como una guía para determinar qué vacunas se requieren para la inscripción en cuidado infantil, programas para la primera infancia y la escuela (en línea, educación en la casa, pública o privada).

Encuentre la edad o el grado del menor y vea si su hijo o hija ha recibido el número de vacunas que muestran las marcas debajo de cada vacuna. La tabla en la parte posterior muestra las edades a las que deben aplicarse las dosis.

Del nacimiento hasta 4 años	Edad: De 5 a 6 años ^③	Edad: De 7 a 11 años	Edad: 12 años y mayores
Programas de niñez temprana y cuidado infantil	Para kindergarten	Para los grados 1.º a 6.º	Para los grados 7.º a 12.º
Hepatitis A (Hep A) ✓			
Hepatitis B (Hep B) ✓✓✓	Hepatitis B ✓✓✓	Hepatitis B ✓✓✓	Hepatitis B ^⑦ ✓✓✓
DTaP/DT ✓✓✓✓	DTaP/DT ^④ ✓✓✓✓✓	✓✓✓ vacunas que contienen ^⑥ dosis contra el tétanos y la difteria	✓ Tdap y DTaP o serie para ponerse al día
Polio ✓✓✓	Polio ^⑤ ✓✓✓✓	Polio ^⑧ ✓✓✓	Polio ^⑧ ✓✓✓
MMR ✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓
Hib ✓			Meningocócica (ACWY) ^⑨ ✓ y refuerzo
Pneumocócica ^① ✓✓✓✓			
Varicela ^② ✓	Varicela ^② ✓✓	Varicela ^② ✓✓	Varicela ✓✓

¡No es demasiado tarde! Si su hijo se ha retrasado en sus vacunas, hable con su médico o clínica para ponerse al día.

Vacunas recomendadas pero no obligatorias:

COVID-19 Para todos los niños en un grupo de edad elegible
Gripe Anualmente para niños de 6 meses y mayores
Rotavirus Para infantes
Virus del papiloma humano A la edad de 11 a 12 años

- ① No se requiere después de 24 meses.
- ② Si el menor ya tuvo varicela, no se requieren vacunas de varicela. Si la enfermedad se presentó después del año 2010, el médico del menor tiene que firmar un formulario para confirmar la enfermedad.
- ③ Los alumnos de primer grado que tengan 6 años y menos tienen que seguir los calendarios para la polio y DTaP/DT para kindergarten.
- ④ La quinta vacuna de DTaP no es necesaria si la cuarta vacuna se aplicó después de los 4 años de edad. Dosis final de DTaP a los 4 años o después.
- ⑤ La cuarta vacuna de polio no es necesaria si la tercera vacuna se aplicó después de los 4 años de edad. Dosis final de polio a los 4 años o después.
- ⑥ Una dosis debe haber contenido la vacuna contra la tos ferina (es decir, DTaP o Tdap) y una dosis se debe haber administrado después de cumplir los cuatro años. Si la primera dosis de la serie se administró antes de los 12 meses de edad, entonces son necesarias cuatro dosis.
- ⑦ También puede usarse un calendario alternativo de dos vacunas de hepatitis B para niños de 11 a 15 años.
- ⑧ Se debe haber administrado al menos una dosis después de cumplir los 4 años. Si la tercera dosis se administró antes de cumplir los cuatro años, es necesaria una cuarta dosis.
- ⑨ Se requiere una dosis de la vacuna meningocócica conjugada ACWY al comienzo del 7.º grado. Se recomienda la dosis de refuerzo de la vacuna meningocócica conjugada ACWY a los 16 años y es un requisito para los estudiantes de 12.º grado.

Exenciones

Para inscribirse en los programas de cuidado infantil, niñez temprana y escuelas en Minnesota, los niños tienen que comprobar que han recibido estas vacunas o presentar una exención legal.

Los padres pueden presentar una exención legal firmada por un proveedor de atención de salud o una exención no médica firmada por el padre, madre o tutor y notariada.